

Begründung für SARS-COV-2 Point of Care PCR (Schnelltest)

Indikation: NUR für Akutaufnahmen MIT Verdacht (lt. unten angeführter Kontaktanamnese und Symptomen) auf SARS-COV-2 Infektion, wenn sich aus dem Testergebnis eine unmittelbare Behandlungskonsequenz (z.B. Heilversuch, Studienmedikation) ergibt.

Ablauf: Formular vollständig ausgefüllt, etikettiert und unterschrieben MIT Abstrichprobe (NUR Copan UTM Abstrichsystem mit Patientenetikett) mittels Rohrpost werktags von 8-15 Uhr an das Infektionslabor (Rohrpost 20; **MIT online-Anforderung**) und zu den übrigen Zeiten an die MZA Notfallaufnahme (Rohrpost 7044) senden.

KEINE Indikation (führt ausnahmslos zur Zurückweisung der Abstrichprobe):

Screening asymptomatischer PatientInnen vor Aufnahme auf Normal- oder Intensivstation
Screening asymptomatischer PatientInnen vor dringlicher OP oder Intervention
Screening vor elektiver OP oder Intervention (Ausnahme: Vor Organtransplantation)
Schockraummanagement (Ausnahme: Koma, keine Exploration möglich)
Betten- und Transfermanagement
Verlaufskontrolle bei bekannter COVID-19
Neuerliche Testung nach rezemtem negativem Vorbefund
Screening nach Kontakt mit Indexfall
Umgebungsuntersuchung
Testung von MitarbeiterInnen
Testung von Angehörigen
Fehlende oder unvollständige Begründung am Begründungsformular

PATIENTENETIKETT

Kostenstelle

Anamnese:

- Enger Kontakt mit bestätigtem oder wahrscheinlichem SARS-COV-2 Infektionsfall
- Komatöse, nicht explorierbare SchockraumpatientIn
- Einberufung zur Organtransplantation

Symptome:

- Neu aufgetretener Husten
- Fieber ($T \geq 38.0^{\circ}\text{C}$)
- Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
- Pneumonie

Anfordernder Arzt/Ärztin
(Name, Vorname)

DECT

Datum, Uhrzeit

Unterschrift